

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานพนักงานวิจัย



วทศ 120922

รายงานการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เรื่อง

การทำแห้งน้ำยาข้นมิ้นกิงสำเร็จรูป
Drying of Thai noodles sauce

กรรมการติดตาม

ดร. ทพ. พันธุ์ญา



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ราชบูรณะเดช
ยุพิน เสนาใหญ่
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันรับ.....
วันลงทะเบียน..... 15 ธ.ค. 2559
เลขทะเบียน..... ๘๙. 248581
เวลาเรียกหนังสือ..... ๖๖๔.๐๒๘ ๑๑๘๗

2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2559

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2559)

คณะกรรมการสอบได้พิจารณารายงานปัญหาพิเศษฉบับนี้ เห็นสมควรรับ
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมการสอบ

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ บุตรศาสตร์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพ ปาลกะวงศ์ ณ อุยธยา)

กรรมการ

(อาจารย์ศนันดร พิชัย)

ราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

คณะกรรมการเกษตร อนุมัติให้รับรายงานปัญหาพิเศษฉบับนี้ เป็นส่วน
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ของ
ราชภัฏมหาสารคาม

คณะกรรมการเทคโนโลยี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์สมมาศ อิฐรัตน์)

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

น้ำยาขنمจีน มีอยู่มากหลายอย่าง เช่น น้ำยากระเทียม น้ำยาป่า น้ำยาแกงเขียวหวาน น้ำยาแกงเผ็ด น้ำเงี้ยว น้ำยาใต้ และน้ำพริก วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมของน้ำยาขنمจีนแต่ละอย่างมีความแตกต่างกันตามแต่ละท้องถิ่น น้ำยาขنمจีนของภาคกลางจะเน้นการใช้กะทิ เครื่องแกงที่ใช้ทำน้ำยาขنمจีนมีสีแดง รสชาติไม่เผ็ดมาก น้ำยาขنمจีนของทางภาคเหนือจะใช้เกรตดอกจิ้วป่ามาเป็นส่วนผสมในน้ำยา น้ำยาขنمจีนภาคใต้จะโดดเด่นในเรื่องเครื่องแกงและสีสันของน้ำยา รสชาติจัดจ้าน ส่วนน้ำยาขنمจีนของภาคอีสานจะเป็นน้ำยาขنمจีนรสจัดแต่ไม่จัดมากเหมือนของภาคใต้ น้ำยาป่าหรือเรียกว่าหอยชี้หรือหอยวัวน้ำยาลาว เป็นน้ำยาขنمจีนที่คนทางภาคอีสานนิยมรับประทานกัน น้ำยาป่าสามารถใช้เนื้อปลาได้หลากหลาย เช่น ปลาทู ปลานิล ปลาทับทิม ปลาช่อน และปลาดุก จุดเด่นของน้ำยาป่าคือ เป็นน้ำยาขنمจีนที่ไม่มีส่วนผสมของกะทิ ปราบรสด้วยน้ำปลาหรือ มีส่วนผสมของสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น กระชาย ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจากน้ำยาขنمจีนมีความซี๊ดซุ่ม จึงเกิดการเสื่อมเสียเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย

น้ำยาขنمจีน น้ำยาป่า เป็นน้ำยาขنمจีนที่เป็นที่รู้จักดีในแถบภาคอีสาน ส่วนประกอบและวัตถุดิบในการทำน้ำยาป่าเหมือนกับการทำน้ำยาขنمจีนทั่วไป สามารถนำปลาหลายชนิดมาทำได้ เช่น ปลาทู ปลานิล ปลาทับทิม และปลาช่อน น้ำยาป่านั้นจะไม่ใส่กะทิเป็นส่วนประกอบ จะมีการเพิ่มกระชายมากกว่าน้ำยาขنمจีนชนิดอื่น ปราบรสด้วยน้ำปลาหรือที่ทำให้น้ำยาป่ามีรสชาติดี นิยมทานคู่กับขنمจีนและผักพื้นบ้านต่างๆตามภาคอีสาน ลักษณะน้ำยาป่าดังแสดงในภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 น้ำยาป่า^{ที่มา : กรรณิกา. (2552)}

การทำแห้ง หรือการดึงน้ำออก เป็นกระบวนการกำจัดน้ำหรือตัวทำละลายอื่นโดยการระเหยจากของแข็ง กึงของแข็งหรือของเหลว กระบวนการนี้มักใช้เป็นขั้นตอนการผลิตสุดท้ายก่อนขายหรือบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีการถนอมอาหารที่นิยมใช้มานาน โดยเป็นการลดความชื้นของอาหารด้วยการระเหยน้ำ ด้วยการอบแห้ง การหยอด หรือการระเหิดน้ำส่วนใหญ่ในอาหารออก เป็นการลดค่า A_w ในอาหารเพื่อเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิด เช่น รา (Mold) ยีสต์

(Yeast) แบคทีเรีย (Bacteria) ที่เป็นสาเหตุให้อาหารเสื่อมเสีย เป็นการยึดอายุการเก็บรักษาอาหารให้นานยิ่งขึ้น และอาหารที่ทำแห้งแล้วมีน้ำหนักเบาทำให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายขนส่งไปยังผู้บริโภค

ผู้ทำการวิจัยเล็งเห็นว่า เนื่องจากน้ำยาขنمจีนไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เกิดการเน่าเสีย การที่จะเก็บรักนาน้ำยาขนมจีนให้ได้นานขึ้น จำเป็นต้องใช้หลักการของการทำแห้งมาช่วย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบา เก็บรักษาได้จ่าย เหมาะกับคนไทยในปัจจุบันที่ชอบความสะดวกสบาย ไม่มีเวลาในการทำอาหาร และเพื่อความสะดวกของผู้บริโภคที่อยากรับประทานขนมจีนน้ำยาแต่ไม่มีเวลาในการทำน้ำยาขนมจีนด้วยตนเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำน้ำยาขนมจีนแห้ง
- 1.2.2 เพื่อศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนแห้ง

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1.3.1 ศึกษาการแปรรูปน้ำยาป้าโดยใช้หลักการทำแห้ง
- 1.3.2 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการละลายของน้ำยาขนมจีนแห้ง
- 1.3.3 ศึกษาคุณภาพด้านเคมี ด้านกายภาพ และทางด้านประสิทธิภาพ ผ่านการทดสอบน้ำยาขนมจีนแห้ง

1.4 นิยามศัพท์

- 1.4.1 น้ำยาขนมจีน เป็นอาหารความอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกง ทำด้วยปลาไข่ลอกกับเครื่องปรุง กินกับผัก เช่น ถั่วงอก ใบแมงลัก นิยมรับประทานคู่กับขนนจีน
- 1.4.2 การทำแห้ง (Drying) หมายถึง การให้ความร้อนภายใต้สภาวะการควบคุมเพื่อกำจัดน้ำที่มีอยู่ในอาหารโดยการระเหยน้ำ วัตถุประสงค์ของการกำจัดน้ำ คือ การยึดอายุการเก็บรักษาอาหาร โดยการลดค่าอัตราเตอร์แอคติวิตี้ (A_w) ซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และการทำงานของเอนไซม์ นอกจากนั้น การลดน้ำหนักและปริมาณของอาหารยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และการขนส่ง เพิ่มความหลากหลายและความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ทราบถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำแห้งน้ำยาขนมจีน
- 1.5.2 ทราบถึงคุณภาพของน้ำยาขนมจีนแห้ง
- 1.5.3 สามารถยึดอายุการเก็บรักนาน้ำยาขนมจีนได้นานขึ้น
- 1.5.4 ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะดวกในการบริโภค

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 น้ำยาขนมจีน

น้ำยาขนมจีน ทางภาคกลาง นิยมรับประทานน้ำพริก น้ำยาแกงเผ็ดชนิดต่าง ๆ น้ำยาจะทำให้เนื้นกระช่ายเป็นส่วนผสมหลัก ส่วนน้ำพริกเป็นขนมจีนแบบชาววัง ปนด้วยถั่วเขียว ถั่วลิสง รับประทานกับเครื่องเคียงทั้งผักสด ผัก寥ก และผักชุบแป้งทอด ขนมจีนหวานน้ำ เป็นขนมจีนที่นิยมทานในช่วงวันสงกรานต์ รับประทานกับสับปะรด จิ้ง พริกขี้หมู กระเทียม มะนาว ราดด้วยหัวกะทิ เคี่ยว ทางสมุทรสงครามและเพชรบุรีจะปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าว ภาคเหนือนิยมรับประทานน้ำเงี้ยวหรือน้ำจิ้วที่มีเกรดออกจิ้วป่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำน้ำยา รับประทานกับแคบหมู และข้าว กับน้ำจิ้น (ข้าวเงี้ยว จีนส้มเงี้ยว) เป็นเครื่องเคียง เดิมที่น้ำขนมจีนยังไม่แพร่หลายในภาคเหนือ เนื่องจากว่าน้ำเงี้ยวเดิมนิยมรับประทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยว ภาคอีสาน นิยมรับประทานน้ำยาขนมจีนป่า ซึ่งปรุงรสนำน้ำยาขนมจีนด้วยน้ำปลา รำ ใส่กระชายเหมือนน้ำยาภาคกลาง และน้ำยาขนมจีนทางภาคใต้ จะเป็นน้ำยาขนมจีนที่มีขี้หมูผสมอยู่ แต่จะไม่มีส่วนผสมของกระชายเหมือนน้ำยาขนมจีนทางภาคกลาง (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2556)

น้ำยาป่า มักจะเป็นอาหารที่มีขายตามร้านอาหารราคาประหยัดที่พบเห็นอยู่ทั่วๆไป น้ำยาป่า มีส่วนประกอบหลักทำมาจากเนื้อปลาดเศษและเยื่อต่อเนื่องกับน้ำและเครื่องปรุง น้ำยาป่าอาจมีรสเผ็ดมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณพริกที่ใส่ลงไป ข้อควรระวังในการทำน้ำยาป่าคือก้างปลาที่มาจากการบดเนื้อปลาให้ละเอียด ในการทำน้ำยาป่าทุกครั้งควรดูให้แน่ใจว่าไม่มีก้างปลาหลงเหลืออยู่เพื่อความปลอดภัยในการกิน น้ำยาป่าไม่มีส่วนผสมของกะทิจึงเหมาะสมสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ที่อยากจะทานขนมจีนน้ำยา

2.2 ส่วนผสมในน้ำยาป่า

2.2.1 ปลานิล ปลานิลนิยมเลี้ยงเพื่อการเกษตรกันอย่างแพร่หลายในภาคพื้นเอเชีย ปลานิลเป็นปลาที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาก คือมีโปรตีนสูงถึง 5.69 กรัม มีโอเมก้า3 (Omega 3 fatty acid) ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย โปรตีนในเนื้อปลาจะถูกนำไปใช้ในการเสริมสร้างเนื้อเยื่อและซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอ ปลานิลเป็นปลาที่มี Saturated Fat คือไขมันอิมตัวต่ำ ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อปลาจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆ โดยเฉพาะสมอง จะป้องกันการจับแข็งตัวของไขมันในเส้นเลือด วิตามินและแร่ธาตุที่มีอยู่ในเนื้อปลาจะควบคุมการทำงานของร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ (กรมอนามัย, 2550)

2.2.2 กระชาย ใช้ส่วนของเหง้าในการทำน้ำยาขนมจีน เหง้ากระชายนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยและมีสารที่สำคัญหลายชนิดสะสมอยู่ซึ่งจะมีสรรพคุณในการดับกลิ่นคาว สารที่มีอยู่ในกระชายคือ สารแคมฟีน (Camphene) ทูจีน (Thujene) และการบูร เหง้ากระชายนิยมนำมาผสมในเครื่องแกงต่างๆ เนื่องจากว่ากระชายมีสารต่างๆ ซึ่งมีสรรพคุณทางที่ช่วยในการแก้โรค เช่น มีสรรพคุณในการบำรุงกำลัง แก้ปวดข้อ แก้วิงเวียน แน่นหน้าอก แก้ท้องเดิน แก้แพลงในปาก และในกระชายยังมีสารอาหาร

ที่มีประโยชน์แก่ร่างกายซึ่งจะพบตรงหน้าของกระชาย คือ แคลเซียม พอสฟอรัส และวิตามินฯ ซึ่งมีประโยชน์แก่ร่างกาย (สุชาติพ, 2554)

2.2.3 พริก ผลของพริกมีรสเผ็ดจัด สีแดงสดสวยงามเหมาะสมสำหรับการปรุงอาหาร มักใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องแกงต่างๆหรือพริกแกง อาหารที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบหรือปรุงรส ได้แก่ อาหารประเภทแกง อาหารประเภททอด อาหารประเภทต้ม อาหารประเภทหมาด รวมถึงอาหารประเภทปิ้งย่าง ที่ต้องการรสเผ็ด ดังนั้น พริกจึงเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะสามารถให้พลังงาน และแร่ธาตุ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เหล็ก แคลเซียม พอสฟอรัส ไทามีน ไรโบฟลาวิน ในอาชิน วิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี โดยเฉพาะวิตามินซี ที่พบมากกว่าผักชนิดอื่นๆพริกมีวิตามินซีสูง เป็นแหล่งของกรด Ascorbic ซึ่งสารเหล่านี้ ช่วยขยายเส้นโลหิตในลำไส้และกระเพาะอาหารเพื่อให้ดูดซึมอาหารดีขึ้น ช่วยร่างกายขับถ่าย ของเสียและนำธาตุอาหารไปยังเนื้อเยื่อของร่างกาย (พีชเกษตรไทย, 2552)

2.2.4 หัวหอมแดง หอมแดงช่วยดับกลิ่นอาหารและเพิ่มรสชาติ เป็นส่วนประกอบสำคัญในเครื่องแกงทุกชนิด ใช้ในอาหารประเภทแกงเผ็ด ต้มโคลัง แกงเลียง ต้มยำ อาหารประเภทหวาน อาหารประเภทหมาด ลับ น้ำพริกต่างๆ หัวหอม มีส่วนช่วยขับลม แก้ท้องอืด ช่วยย่อยและเจริญอาหาร แก็บวนน้ำ แก้อการอักเสบต่าง ๆ ในหัวหอมสัดจะประกอบไปด้วย น้ำมันหอมระเหย และมี Flavonoid Glycoside Pectin และ Glucokinin สารส่วนใหญ่ที่พบในหอมใหญ่จะคล้ายกับที่พบในหอมแดง แต่ปริมาณสารที่พบจะน้อยกว่าในหอมแดงนокจากานี้ หอมแดงยังมีคุณสมบัติ เป็นยา รักษาโรค ใช้ลดไข้และรักษาแพลงไนท์ โดยเอาหัวหอมแดงมาซอยเป็นแวร์นๆ ผสมกับน้ำมันมะพร้าวและเกลือ ต้มให้เดือด แล้วนำมาพอกแพลง นอกจากนั้นหอมแดง ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และยับยั้งเส้นเลือดอุดตัน ด้วยการบริโภคสด หรือประกอบอาหาร หรือปรุงน้ำดอง (สุกัญญา, มป)

2.2.5 ตะไคร้ ใช้ส่วนของเหง้าและลำต้นแก่ ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารที่สำคัญหลายชนิด เช่น ต้มยำ และอาหารไทยหลายชนิด ให้กลิ่นหอม ตะไคร้ยังแก้กลิ่นอาหารหรือดับกลิ่นอาหารของปลาและเนื้อสัตว์ได้ดีมาก (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2557)

2.2.6 ขา เป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารมากมาย ใช้ใส่ในต้มขา ต้มยำ น้ำพริกแกง ทุกชนิดได้ ขาเป็นส่วนประกอบ ยกเว้น แกงเหลืองและแกงกอและทางภาคใต้ที่ไม่นิยมใช้ขา มีบทบาทในการดับกลิ่นอาหารของเนื้อและปลา หน่อขาอ่อน เป็นหน่อของขาที่เพิ่งจะแทงยอดออกจากลำต้น ติดตัน ถ้าอายุประมาณ 3 เดือนเรียกหน่อขา ถ้าอายุ 6-8 เดือนเรียกขาอ่อน ถ้าอายุมากกว่า 1 ปี จะเป็นขาแก่ ปริมาณน้ำมันหอมระเหยประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ หน่อขาอ่อนทั้งสุดและลวกใช้จิ้ม宦 และน้ำพริก นำมาทำ ข้างมีถุงทึบทางยา เหง้าแก้แก้วดหอง จุกเสียด แนะนำ ดอกใช้หาแก้กลาก เกลือก ผลช่วยย่อยอาหาร แก้กลิ่นเหมียน อาเจียน ตันแก่น้ำไปเคลียร์กับน้ำมันมะพร้าว ทาแก้ปวดเมื่อย เป็นตะคริว ใบมีรสเผ็ดร้อน แก้พยาธิ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2558)

2.2.7 กระเทียม เนื้อกระเทียมในกลีบมีสีเหลืองอ่อนและใส มีน้ำเป็นองค์ประกอบสูง มีกลิ่นฉุน จัด ประโยชน์ของกระเทียมคือเป็นส่วนประกอบของอาหารควบคู่หลากหลายมาก ทั้งต้ม ผัด แกง ทอด ประโยชน์ของกระเทียมคือช่วยรักษาแพลงท์เน่าเปื่อยและเป็นหนอง ป้องกันโรคเบาหวาน และช่วยจัดพิษสารต่างๆ กระเทียมมีฤทธิ์ร้อน รสเผ็ด ช่วยเจริญอาหาร ขับลมในลำไส้ แก้บิด แก้ไอ กลากเกลือก กระเทียมสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือด ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มระดับ

ของไขมันชนิดดี ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบหลอดเลือดหัวใจ และกระเทียมยังมีคุณสมบัติลดความดันเลือด (ผลการ rog, 2557)

2.2.8 ปลาร้า หรือปลาแดก เป็นอาหารหลัก และเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุดในวัฒนธรรมของภาคอีสาน ลักษณะของปลาร้าอีสานคือมักทำจากปลานำ้าจืดขนาดเล็ก เช่น ปลาสร้อยขาว ปลากระดี่มา หมักกับรำข้าวและเกลือ แล้วบรรจุใส่ไห หมักไว้ประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี ก็สามารถนำมารับประทานได้ แต่ก่อนที่จะนำมารับประทานก็ควรที่จะทำให้สุกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและปลอดจากพยาธิ (นรินทร์, 2552) การนำปลาร้าไปต้มกับน้ำแล้วกรองเอาแต่น้ำเป็นน้ำปลาเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญของอาหารอีสานปลาร้านำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด ตั้งแต่ น้ำพริก แกงต่างๆของทางภาคอีสาน น้ำยาป่า 宦 อาหารที่ปรุงด้วยปลาที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือส้มตำโดยสัมทำที่ใส่ปลาร้าน้ำจะเรียกว่า ส้มตำลาว หรือ ส้มตำปลาร้า ปลาร้ามีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ได้แก่ สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่

2.3 การทำแห้ง (Dehydration)


การทำแห้ง หรือการดึงน้ำออก อาจเรียกว่า Drying การทำแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหาร (Food preservation) ที่นิยมใช้มานาน โดยลดความชื้น (Moisture content) ของอาหารด้วยการระเหยน้ำ ด้วยการอบแห้ง (Dehydration) การทอด (Frying) หรือการระเหิดน้ำส่วนใหญ่ในอาหารออก วัตถุประสงค์ของการทำแห้งอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การทำแห้งเป็นการลดปริมาณน้ำในอาหาร เพื่อ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทุกชนิด เช่น รา (Mold) ยีสต์ (Yeast) แบคทีเรีย (Bacteria) ที่เป็นสาเหตุให้อาหารเสื่อมเสีย (Microbial spoilage) ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ (Enzyme) หรือชัลลอปภูมิริยาต่างๆ ทั้งทางเคมีและทางชีวเคมีซึ่งมีน้ำเป็นส่วนร่วมและเป็นสาเหตุให้อาหารเสื่อมเสีย (Food spoilage) ทำให้อาหารปลอดภัย การลดปริมาณน้ำในอาหารโดยการทำแห้งทำให้อาหารมีค่าอtoter์แอคทิวิตี้ (Water activity) น้อยกว่า 0.6 ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen) รวมทั้งยับยั้งการสร้างสารพิษของเชื้อรา (Mycotoxin) เช่น Aflatoxin เพื่อทำให้อาหารมีน้ำหนักเบา ลดปริมาตร ทำให้สะดวกต่อการขนส่ง การบริโภค หรือการนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปต่อเนื่องด้วยวิธีอื่นๆสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกของผู้บริโภคมากขึ้น (พิมพ์เพ็ญ และคณะ, มปป)

2.4 การอบแห้งแบบถาด (Tray Drying)

ในกระบวนการผลิตอาหารอบแห้ง ขั้นตอนในการอบแห้งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง การอบแห้งแบบถาดเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการผลิตผักและผลไม้อบแห้ง โดยการอบแห้งในเครื่องอบแห้งแบบถาด จะอาศัยลมร้อนจากแหล่งความร้อน ซึ่งอาจจะเป็น อีทเตอร์ คอล์ยไอน้ำ ก๊าซหุงต้ม หรือน้ำมันเตา ลมร้อนจะไหลผ่านอาหารที่วางเป็นชั้นบางๆ (ประมาณ 2-6 เซนติเมตร) ในชั้นของถาดอาจจะมีรูพรุนหรือไม่มีก็ได้ ความเร็วลมที่ไหลเวียนอยู่ในช่วง 0.5-5 เมตร/วินาที มีระบบบังคับทิศทางการไหลของลมร้อนภายใต้เครื่องใช้แผ่นเหล็กบางๆ กัน เพื่อให้ลมร้อนไหลอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงทุกส่วน

กลไกการทำแห้ง เมื่ออากาศหรือลมร้อนพัดผ่านหน้าอาหารที่เปียก ความร้อนจะถูกถ่ายเทไปยังผิวของอาหารจะระเหยออกมารด้วยความร้อนแห้งของการเกิดไอ ไอน้ำจะแพร่ผ่านอากาศและถูกพัดพาไปโดยลมร้อนที่เคลื่อนที่ กระบวนการดังกล่าวจะทำให้ความดันไอที่ผิวน้ำของอาหารต่ำกว่าความดันในด้านในอาหาร เป็นผลให้เกิดความแตกต่างของความดันในน้ำ อาหารชั้นด้านในจะมีความดันในสูงและค่อยๆลดต่ำลงเมื่อขึ้นอาหารเข้าใกล้อาหารแห้ง ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดแรงดันเพื่อไอน้ำออกจากอาหาร ในกระบวนการผลิตอาหารอบแห้งขั้นตอนการอบแห้งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง

เครื่องอบแห้งแบบถาด มีลักษณะดังแสดงในภาพที่ 2.1 เครื่องอบแห้งแบบถาดใช้ในการลดความชื้นของวัสดุ เช่น และมักพบได้ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เพราะการอบแบบสร้างเครื่องไม่ยุ่งยากและทำงานอบแห้งได้ดี เครื่องอบแห้งแบบถาดมักจะมีบริเวณที่ใช้อบแห้งในห้องสีเหลี่ยม ซึ่งจะมีขนาดเล็กกระดับห้องทดลองไปจนกระทั่งห้องขนาดใหญ่ที่สามารถบรรจุของแข็งเป็นคันรถได้ เครื่องอบแห้งแบบถาดจะเป็นการอบแห้งแบบวดโดยของแข็งเปียกจะถูกนำเข้าไปอบแห้ง และเมื่อเสร็จการอบแห้งก็จะถูกนำออกจากเครื่อง การอบแห้งเกิดขึ้นโดยใช้อากาศร้อนพัดผ่านผิวน้ำของแข็งเปียกในถาด ซึ่งจะเป็นการอบแห้งแบบสัมผัสร่าง (กุลชนากุลและคณะ, 2554)



ภาพที่ 2.1 ส่วนประกอบเครื่องอบแห้ง
ที่มา : พิมพ์เพญ และคณะ. (มปป)

2.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการอบแห้ง

2.5.1 ลักษณะธรรมชาติของอาหาร อาหารที่มีลักษณะเป็นรูพรุน มีความพรุน (Porosity) มาก จะมีอัตราการอบแห้งเร็วเนื่องจากน้ำในอาหารสามารถเคลื่อนจากภายในออกมายานอกได้ง่าย นอกจากน้ำในอาหารที่มีพื้นที่ผิวมากอัตราการอบแห้งสามารถเกิดได้เร็วเช่นกัน ทั้งนี้ก็เนื่องจากพื้นที่การระเหยของน้ำในวัสดุเพิ่มขึ้นมาก


2.5.2 ขนาด รูปร่าง ปริมาตร และพื้นที่ผิวของอาหาร เป็นสมบัติทางกายภาพของอาหาร ที่มีผลต่อการทำแห้ง อาหารที่มีอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรมาก จะมีพื้นที่ระเหยน้ำมาก จะมีอัตราการทำแห้งเร็วขึ้น ดังนั้นหากอาหารที่มีความหนามากอัตราการอบแห้งจะช้ากว่าอาหารที่มีความหนาอยู่กว่าเนื่องจากอัตราการทำแห้งจะเป็นสัดส่วนผกผันกับความหนาของอาหาร

2.5.3 ปริมาณของอาหารที่นำมาอบแห้ง อาหารที่นำมาอบแห้งในปริมาณมากๆ จะมีอัตราการอบแห้งที่ช้าเนื่องจากอากาศร้อนไม่สามารถสัมผัสถกับอาหารที่นำมาอบแห้งได้อย่างทั่วถึง จึงไม่สามารถถ่ายเทความร้อนให้กับอาหารได้ จึงทำให้อัตราการอบแห้งช้าลง

2.5.4 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และความชื้นจำเพาะ (Specific humidity) ของอากาศเป็นสิ่งสำคัญมาก การระเหยน้ำออกจะทำได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศและความเร็วลม

2.5.5 ความดัน เกี่ยวกับการระเหยของน้ำ เนื่องจากในที่ความดันต่ำๆ ลงมา น้ำจะเดือดได้ที่อุณหภูมิต่ำลง ดังนั้นการทำแห้งภายใต้ความดันจะทำให้อัตราการทำแห้งเร็วขึ้น

อัตราการทำแห้งของอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 2.2 อัตราการทำแห้งขึ้นอยู่กับสภาพธรรมชาติของอาหารเริ่มต้นก่อนการทำแห้ง และสภาวะแวดล้อมระหว่างการทำแห้ง เช่น ชนิดของเครื่องทำแห้ง (Drier) อุณหภูมิ เวลา ความชื้นสัมพัทธ์ และสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (Heat transfer coefficient)



ภาพที่ 2.2 อัตราการทำแห้ง
ที่มา : พิมพ์เพ็ญ และคณะ. (มปป)

ช่วงการปรับสภาวะเบื้องต้น (A-B) เป็นช่วงเริ่มต้นที่อาหารที่ใช้ในการอบแห้ง มีความชื้นเริ่มต้น (A) ของอาหารยังสูงอยู่ ผิวของอาหารจะมีลักษณะเปียกชื้นมาก เกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างตัวกลางลมร้อนกับอาหาร ช่วงอัตราการทำแห้งคงที่ (B-C) เป็นช่วงที่น้ำภายในวัสดุเคลื่อนที่มาที่ผิวน้ำ พลางงานความร้อนที่วัสดุได้รับจะใช้ในการระเหยน้ำออกจากของวัสดุอย่างต่อเนื่อง ความชื้นเฉลี่ยของวัสดุจะลดลงเป็นสัดส่วนกับเวลาในการอบแห้ง จุดสุดท้ายของช่วงการทำแห้งความเร็วคงที่อัตราเร็วในการอบแห้งจะเริ่มลดลง ความชื้นของวัสดุ ณ เวลานี้ เรียกว่า ความชื้นวิกฤต (Critical moisture content) ช่วงอัตราการทำแห้งลดลง (C-D) เป็นช่วงที่ความชื้นในอาหารเหลือน้อยจนแทบไปยังผิวน้ำอาหารอย่างไม่ต่อเนื่อง ผิวน้ำของอาหารเริ่มแห้ง ทำให้อุณหภูมิที่ผิวของอาหารสูงขึ้นเรื่อยๆ อัตราการทำแห้งจะลดลงความชื้นจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงค่าความชื้นสมดุล (XE) ซึ่งเป็น

ความชื้นที่ต่ำสุด ภายใต้สภาพที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ที่ความชื้นนี้ อัตราการทำแห้งเป็นศูนย์ น้ำในอาหารไม่สามารถระเหยออกมากได้อีก (พิมพ์เพญ และคณะ, ๘๗)

2.6 การคืนรูปของอาหารแห้ง

การคืนรูปของอาหารแห้ง หมายถึงการดูดซึมน้ำกลับคืนของอาหารแห้งเพื่อเข้าสู่สภาพเดิม คล้ายก่อนการทำแห้ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ผงที่ละลายน้ำได้ทันที (Instant powder) ควรมีลักษณะดังนี้

2.6.1 พื้นที่ในการดูดซึมน้ำปริมาณมาก (Wettability) ความสามารถของอนุภาคของผงในการดูดซึมน้ำบนพื้นผิวของอนุภาค คุณสมบัติดังกล่าวขึ้นกับขนาดและองค์ประกอบทางเคมีของผิวอาหาร อาหารที่มีขนาดอนุภาคเล็ก มีแนวโน้มจับตัวกันเป็นก้อนแน่นโดยภายในยังคงมีผ่องอาหารที่แห้งอยู่ ทำให้น้ำซึมผ่านได้ลำบากและอัตราการดูดซึมน้ำต่ำ

2.6.2 ความสามารถในการจมตัว (Sinkability) ความสามารถของผงในการจมลงไปในน้ำหลังจากผงเกิดการดูดซึมน้ำบนพื้นผิวของอนุภาค และถูกกระแทบโดยความหนาแน่นของอนุภาค ความสามารถในการจมตัวของอนุภาคในน้ำขึ้นกับขนาดและความหนาแน่นของอาหารผง โดยพบว่าขนาดอนุภาคที่ใหญ่กว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าจะจมตัวอย่างรวดเร็วกว่าอนุภาคขนาดเล็กและเบา สำหรับอนุภาคที่มีอักษรภาษาไทยหรือมีโครงสร้างที่โปร่งจะมีความสามารถในการจมตัวได้ช้าหรือน้อยกว่า เนื่องจากอนุภาคมีความหนาแน่นและน้ำหนักที่เบาซึ่งจะลอยที่ผิวน้ำ

2.6.3 ความสามารถในการกระจายตัว (Dispersibility) ความสามารถของผงในการกระจายตัว โดยไม่เกิดเป็นก้อน อาหารจะละลายในน้ำได้ดีจะต้องกระจายตัวในน้ำได้ดีด้วย อาหารที่จะกระจายตัวได้ขึ้นกับพื้นผิว (Surface) และความหนาแน่น (Bulk density) ของอนุภาค แต่ถ้าอาหารรวมกันเป็นก้อนใหญ่การกระจายตัวจะเกิดขึ้นน้อยลง

2.6.4 การละลายน้ำ (Solvability) อัตราการละลายหรือความสามารถในการละลายทั้งหมดขึ้นกับส่วนประกอบทางเคมี ขนาด รูปร่าง ความหนาแน่นของอนุภาค และสถานะทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิในการละลาย ในกระบวนการทำแห้งที่อุณหภูมิสูงซึ่งทำให้ปรตินเสียสภาพ จะส่งผลให้มีความสามารถในละลายน้ำต่ำลง

สมบัติทั้ง 4 ประการนี้จะมีผลต่อการคืนรูปของอาหารแห้งที่เป็นผง ซึ่งสมบัติเหล่านี้จะต้องสมดุลกันถ้าสมบัติประการใดเปลี่ยนแปลงไป การคืนรูปของอาหารนั้นจะเปลี่ยนไปด้วย ทั้งนี้สมบัติบางอย่างที่กล่าวถึง เช่น ขนาดของอนุภาค ความหนาแน่น อุณหภูมิ ความหนืด ปริมาณของแข็ง มีผลต่อการคืนรูปแล้วยังส่งผลต่อลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้ (Barbosa และ Vega, ๑๙๙๖)

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จุฑามาศ และเฉลิมพล (๒๕๕๔) ทำการศึกษาหาอัตราส่วนของสารให้ความมันในผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมเจนกิงสำเร็จรูป ๓ ชนิด ได้แก่ กะทิสด กะทิสำเร็จรูป และนมสด ในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ๔๐ ๕๐ และ ๖๐ ของส่วนผสมทั้งหมด ผู้ทดสอบชินให้การยอมรับในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐ มากที่สุด การคัดเลือกสารให้ความมันทั้ง ๓ ชนิด พบว่า กะทิสด ในอัตราส่วนร้อยละ ๕๐ ของส่วนผสมทั้งหมด มีความชื้น โปรตีน ไขมัน เกล้า และเยื่อไผ่ เท่ากับ ๗.๓๑ ๒๙.๕๖ ๒๒.๘๐ ๑๐.๒๙ และ ๖.๒๕ ตามลำดับ ค่า

$L^* a^* b^*$ มีค่า เท่ากับ 52.34 20.12 และ 40.85 ตามลำดับ แสดงถึงลักษณะสีแดงและสีเหลืองมาก ที่สุด อัตราส่วนของน้ำที่เหมาะสมในการคืนรูป ผู้บริโภคยอมรับในอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ต่อน้ำ ในอัตราส่วน 1:4 มากที่สุด

ปาจารีํ และคณะ (มปป) ศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแกงส้มกึ่งสำเร็จรูป ชนิดผงด้วยเครื่องอบลมร้อน พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องแกงส้มชนิดผง คือ การอบที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 นาที ในกรณีเคราะห์คุณภาพมีถ้าเป็นองค์ประกอบมาก ที่สุด คิดเป็น 38.98 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ โปรตีน 23.89 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10.04 เปอร์เซ็นต์ และความชื้น 5.86 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคยอมรับแกงส้มที่ปรุงด้วยเครื่องแกงผงไม่แตกต่างกับเครื่องแกงสดในด้านกลิ่น ลักษณะปรากวัต และรสชาติ

ชุมพูนุช และคณะ (2551) ทำการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบแห้ง เครื่องแกงส้มกับเครื่องแกงคั่วกลิ้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน เพื่อทำการอบเครื่องแกงให้มีปริมาณความชื้น สุดท้ายไม่เกินร้อยละ 10 ที่อุณหภูมิ 3 ระดับ คือ 50 องศาเซลเซียส นาน 150 นาที 60 องศาเซลเซียส นาน 120 นาที และ 70 องศาเซลเซียส นาน 90 นาที อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบ เครื่องแกงคือ 60 องศาเซลเซียส นาน 120 นาที เนื่องจากทำให้เครื่องแกงแห้ง 2 อย่าง มีค่าความชื้นลดลงเหลือน้อยที่สุด คือ แกงส้มมีปริมาณความชื้นร้อยละ 6.70 และแกงคั่วกลิ้งมีปริมาณความชื้นร้อยละ 6.41 ซึ่งปริมาณความชื้นที่เหลือไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด

กัญญาณัฐ และคณะ (2555) ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง โดยแบ่ง การทดลองออกเป็น 2 ส่วน คือ ศึกษาอัตราการอบแห้งมะกอกป่าที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำพริก และพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของน้ำพริกมะกอกป่าอบแห้ง ในกรณีศึกษาอัตราการทำแห้งของเนื้อ มะกอกป่าที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 10 ชั่วโมง พบว่าความชื้นของมะกอกลดลงอย่างรวดเร็วใน 6-7 ชั่วโมงแรกของการอบแห้ง และลดลงในอัตราค่อนข้างต่ำหลังจาก 7 ชั่วโมง เมื่อทดสอบการคืน ตัวของมะกอกแห้งที่อุณหภูมิห้อง พบว่าขนาดชิ้นมะกอกมีผลต่อความสามารถในการคืนตัว โดย มะกอกแบบผง (720 ไมครอน) สามารถคืนตัวได้ดีที่สุด โดยใช้เวลาเพียง 2 นาที โดยที่น้ำอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ช่วยให้มะกอกแห้งคืนตัวได้ดีที่สุด

พิมพ์จันทร์ และมุทิตา (2556) ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำตาลผงกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้วิธีการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อน (Hot air oven) โดยการนำเนื้อลูกตาลสุกที่ได้ไปทำแห้งด้วย วิธีการทำลมร้อนที่อุณหภูมิ 55-60 และ 65 องศาเซลเซียส วัดค่าความชื้นทุก 2 ชั่วโมง ผลการ ทดลองการทำแห้งที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการทำแห้ง 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการทำแห้ง 6 ชั่วโมง และที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการทำแห้ง 4 ชั่วโมง ให้ค่าความชื้นใกล้เคียงกัน เท่ากับ 2.20, 2.17 และ 2.16 ตามลำดับ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง มีความสามารถในการละลายดีที่สุดเท่ากับร้อยละ 15.71 เมื่อนำตาลผง ที่ได้จากการทำแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมงนำมาทำผลิตภัณฑ์ขนมตาล พบร่วมกับความชอบรวมของผู้บริโภคสูงที่สูง

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์

3.1.1 วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำน้ำยาขนมจีนอบแห้ง

เนื้อปานิล หอยแడง ขา กระเทียม กระชาย พริกชี้ฟ้า ใบมะกรูด ตะไคร้ น้ำปลา น้ำตาล ทราย เกลือ (วัตถุดิบทั้งหมด มาจากตลาดเกษตร อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม) หม้อ ทพพี ดาด ครก สาเก เขียง มีด ตาชั่ง 2 ตำแหน่ง ตู้อบลมร้อนแบบพาด ถาดสำหรับใช้盛น้ำยาขนมจีนเพื่อบดแห้ง เครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบมือถือ ถุงมือกันร้อน

3.1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์

1) อุปกรณ์ตรวจสอบค่า A_w ในอาหาร

1.1) เครื่องวัดค่า A_w (A_w CX3TE AQUA LAB)

1.2) ตับพลาสติกใส่ตัวอย่างอาหาร

2) อุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นของน้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป

2.1) ตู้อบลมร้อน

2.2) ถ้วยอะลูมิเนียม

2.3) ตาชั่ง 4 ตำแหน่ง

2.4) โดดความชื้น Desiccator

3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้วัดค่าสี

3.1) เครื่องวัดสี ColorFlex EZ

3.2) ปีกเกอร์ (Beaker)

3.3) ช้อนตักสาร

3.4) น้ำกัลลัน

4) อุปกรณ์ในการศึกษาการคืนตัวของน้ำยาขนมจีนแห้ง

4.1) เครื่องซีชั่ง 4 ตำแหน่ง

4.2) ปีกเกอร์

4.3) กระดาษกรองเบอร์ 93

4.4) อ่างควบคุมอุณหภูมิ

4.5) ช้อนตักสาร

5) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสมบัติทางประสาทสัมผัส

ชุดอุปกรณ์ทดสอบชิม ประกอบด้วย ถ้วยพลาสติกขาว ช้อนเล็ก ถาด แก้วน้ำดื่ม และแบบประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัส ใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 20 คน

3.2 วิธีดำเนินการทดลองทำน้ำยาขnm Jinแห้ง

3.2.1 การเตรียมน้ำยาขnm Jin น้ำยาป่าปานิล โดยมีส่วนผสมดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมของน้ำยาขnm Jin (น้ำยาป่า)


ส่วนผสม	ปริมาณ(กรัม)
เนื้อปานิลต้ม	1000
ขา	150
หومแดง	150
กระเทียม	70
กระชาย	225
พริกชี้ฟ้าสด	100
น้ำปลาร้า	225
เกลือ	18
น้ำตาล	10


ที่มา : กรมนิภา (2550)

ขั้นตอนการทำน้ำยาป่า นำขา หومแดง กระเทียม กระชาย และพริกชี้ฟ้ามาต้มให้สุกใช้เวลาในการต้มนาน 10 นาที นำขึ้นพักไว้เพื่อจะทำเป็นเครื่องแกง จากนั้นนำส่วนผสมของเครื่องแกงมาป่นผสมกันให้ละเอียดโดยใช้เครื่องป่นไฟฟ้า นำเนื้อปานามาครอกผสมกับเครื่องแกงที่ป่นแล้ว ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า เกลือ และน้ำตาล

3.2.2 ขั้นตอนในการทดลอง

หลังจากการเตรียมน้ำยาขnm Jin นำน้ำยาขnm Jinที่ได้ชั่งน้ำหนักประมาณ 200 กรัม/ถ้วย เกลี่ยน้ำยาขnm Jinออกเพื่อที่จะทำการอบแห้ง นำน้ำยาขnm Jinเข้าอบในตู้อบลมร้อน ใช้อุณหภูมิในการอบแห้ง 3 อุณหภูมิ คือ 50 องศาเซลเซียส เวลา 12 ชั่วโมง อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เวลา 10 ชั่วโมง และอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เวลา 8 ชั่วโมง อบจนกว่าน้ำยาขnm Jinเมื่อมองด้วยสายตามีลักษณะแห้ง แล้ววัดค่า Aw มีค่าต่ำกว่า 0.4 แสดงว่า�ยาขnm Jinแห้ง แล้วนำมาดจากนั้นเก็บน้ำยาขnm Jinที่บดแล้วใส่ถุงปิดให้สนิท เพื่อที่จะนำไปตรวจสอบคุณภาพต่อไป ขั้นตอนในการทดลองทำน้ำยาขnm Jinอบแห้ง ดังแสดงในภาพที่ 3.1





ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการอบน้ำยาขันมีนจีน
ที่มา : ดัดแปลงจาก จุฑามาศ และเฉลิมพล (2554)

3.2.3 การศึกษาคุณภาพของน้ำยาขันมีนอบแห้ง

1) การศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีของน้ำยาขันมีนอบแห้ง

1.1) การวัดค่า A_w น้ำยาขันมีนจีน

การวัดค่า A_w โดยใช้เครื่องวัด A_w (A_w CX3TE AQUA LAB) โดยก่อนทำการวัด จะต้องทำการ สอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration โดยจะใช้น้ำกลั่นในการเทียบ ค่า A_w ของน้ำกลั่น จะต้อง มีค่าไม่น้อยกว่า 0.99 จากนั้นนำตัวอย่างน้ำยาขันมีนจีนกึ่งสำเร็จรูปที่ทำการอบที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียสใส่ตับทดสอบ 3 ตับ โดยใส่ให้เต็มพื้นผิวของตับทดสอบ ทำการวัดค่า A_w (เครื่อง A_w CX3TE AQUA LAB จะอ่านค่าอัตโนมัติ) วัดตัวอย่างอุณหภูมิละ 3 ชั้้า บันทึกค่าทุกครั้ง และทำการเลือกอุณหภูมิที่มีค่า A_w เหมาะสมที่สุด

1.2) การหาความชื้นของน้ำยาขันมีนจีนแห้ง

การหาความชื้นแบบ AOAC (2000) เพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำยาขันมีนจีนที่อบแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิ โดยการอบถ้วยอลูมิเนียมในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนน้ำหนักคงที่จากนั้นทำให้เย็นใน Desiccator นำมาซึ่งน้ำหนักที่แน่นอน ซึ่งตัวอย่างน้ำยาขันมีนจีนที่อบแห้งประมาณ 3 กรัม ใส่ลงในถ้วยอลูมิเนียมที่อบแห้ง และบันทึกน้ำหนักที่แน่นอน นำถ้วยอลูมิเนียมที่บรรจุตัวอย่างน้ำยาขันมีนจีนแห้งเข้าอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นำเอามาใส่ใน

Desiccator ทึ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง นำมาซึ่งน้ำหนัก จะได้น้ำหนักตัวอย่างหลังจากอบแห้งแล้ว การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร และเลือกอุณหภูมิที่มีความชื้นที่เหมาะสมที่สุด

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความชื้น} = \frac{\text{น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)}}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)} \times 100}$$

2) การศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพของน้ำยาข่นเจ็นหลังการอบแห้ง

2.1) การวัดค่าสีของน้ำยาข่นเจ็น

ในการวัดสีของน้ำยาข่นเจ็น มี 2 แบบ ได้แก่ การวัดสีน้ำยาข่นเจ็นหลังการอบแห้ง และการวัดสีของน้ำยาข่นเจ็นที่ทำการละลายน้ำร้อน โดยในการวัดสี จะใช้เครื่องวัดสี ColorFlex EZ ในการวัดค่าสี ซึ่งจะแสดงผลค่าสี เป็นค่า L* a* b* ก่อนการใช้เครื่องวัดสี ต้องทำการ Standardized เครื่องด้วยแผ่น Black glass และ With glass ก่อนการวัดตัวอย่าง การวัดสีน้ำยาข่นเจ็นอบแห้ง

- การวัดสีน้ำยาข่นเจ็นหลังจากการอบแห้ง โดยการบดตัวอย่างน้ำยาข่นเจ็นที่อบแห้งให้ละเอียด นำน้ำยาข่นเจ็นบดละเอียดใส่ในถ้วยในปริมาณที่แสงจากเครื่องวัดสีไม่สามารถส่องทะลุได้ นำน้ำยาข่นเจ็นแห้งไปวัดค่าสีจำนวน 3 ชี้ อ่านค่าที่ได้ของแต่ละชี้ นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ

- การวัดสีน้ำยาข่นเจ็นหลังการละลายน้ำร้อน โดยการบดตัวอย่างน้ำยาข่นเจ็นที่อบแห้งให้ละเอียด นำน้ำยาข่นเจ็นที่บดละเอียดละลายน้ำเดือดอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นำน้ำยาข่นเจ็นที่ละลายน้ำแล้วนำไปวัดค่าสีจำนวน 3 ชี้ อ่านค่าที่ได้ของแต่ละชี้ นำค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ

2.2) การศึกษาการดูดซับน้ำของน้ำยาข่นเจ็นแห้ง

การหาค่าการดูดซับน้ำของน้ำยาข่นเจ็นด้วย方法 จากการดูดซับน้ำของมะกอกป่าผง (กัญญาณัฐ, 2555) การคืนตัวของน้ำยาข่นเจ็นแห้ง การละลายน้ำยาข่นเจ็นในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสโดยจะใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิ จับเวลาในการละลาย 2 4 6 8 และ 10 นาที หลังจากการละลายจะนำน้ำยาข่นเจ็นที่ละลายตามเวลาที่กำหนดมากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 93 เพื่อหาค่าการดูดกลืนน้ำของน้ำยาข่นเจ็น และเวลาที่เหมาะสมในการละลายน้ำยาข่นเจ็นขั้นตอนและวิธีการคือ นำน้ำยาข่นเจ็นอบแห้ง นำมาปั่นลดขนาดด้วยเครื่องปั่น ชั่งตัวอย่างน้ำยาข่นเจ็นแห้ง 2 กรัม ใส่ในบิกเกอร์ เติมน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่ทราบน้ำหนักแน่นอนประมาณ 10 กรัม แซททิ้งไว้เป็นเวลา 2 4 6 8 และ 10 นาที โดยจะแซทไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลาจึงนำมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 93 ใช้เวลาในการกรอง 30 นาที นำน้ำส่วนใสที่กรองได้ไปซึ่งน้ำหนัก ทดลอง 3 ชี้ คำนวณปริมาณน้ำที่น้ำยาข่นเจ็นอบแห้งสามารถดูดซับไว้ได้ (กรัมต่อกรัมตัวอย่าง) คำนวณผลการทดลอง ดังสมการ

$$\text{ปริมาณน้ำที่ถูกดูดซับ} = \frac{\text{น้ำหนักน้ำเริ่มต้น (กรัม)} - \text{น้ำหนักน้ำที่กรองผ่านกระดาษกรอง (กรัม)}}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)}}$$

คำนวณผลการทดลอง เพื่อเลือกอุณหภูมิในการอบแห้งน้ำยาขنمจีน ที่มีความเหมาะสมที่สุด เลือกอุณหภูมิที่มีการคูดซับน้ำที่ดีและคูดซับเร็วที่สุดมา 1 อุณหภูมิโดยคัดเลือกจากอุณหภูมิในการอบทั้ง 3 อุณหภูมิ เพื่อที่จะนำไปทดสอบทางประสาทสัมผัสต่อไป

3.2.4 การทดสอบทางประสาทสัมผัส

ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสจะทำการทดสอบ 2 แบบ คือแบบที่ 1 เก็บคะแนนความชอบ 9-Points Hedonic scale เพื่อทำการเก็บคะแนนความชอบของน้ำยาขنمจีน โดยจะเก็บคะแนนในเรื่อง ลักษณะปราศจาก สี กลิ่น รสชาติ ความชอบโดยรวม และแบบที่ 2 การเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ Paired comparison test เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาขنمจีนที่ผ่านการอบแห้ง เมื่อนำมาล่ำยาน้ำร้อนแล้วจะมีความเหมือนหรือต่างจากน้ำยาขنمจีนที่ทำขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนในการทดสอบมีดังนี้

- 1) เตรียมตัวอย่างน้ำยาขنمจีนชิ้นใหม่
- 2) เตรียมตัวอย่างน้ำยาขنمจีนแบบแห้งแล้วนำมารลยาน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เวลา 4 นาที
- 3) เตรียมน้ำยาใส่ถ้วยเพื่อให้ผู้ทดสอบชิม
- 4) ให้ผู้ทดสอบชิมกรอกแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบความชอบโดยรวม (9-Points Hedonic scale)
- 5) ให้ผู้ทดสอบชิมกรอกแบบทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบวิธีการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ (Paired comparison test)
- 6) เก็บรวมแบบทดสอบแล้วนำไปประเมินผล

**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY**

บทที่ 4

ผลการวิจัย

4.1 ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีของน้ำยาขนมเจนหลังการอบแห้ง

ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีของน้ำยาขนมเจนแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิ จากการวัดค่า A_w และเปอร์เซ็นต์ความชื้น พบร่วมค่า A_w ที่ได้มีค่าใกล้เคียงกันอยู่ที่ $0.33 - 0.39$ และเปอร์เซ็นต์ความชื้นในน้ำยาขนมเจนอบแห้ง อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีความชื้นสูงสุดเท่ากับ 8.62 เปอร์เซ็นต์ แสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีน้ำยาขนมเจนหลังการอบแห้ง

อุณหภูมิ	ค่า A_w	เปอร์เซ็นต์ความชื้น
50	0.39 ± 0.02^a	8.62 ± 0.52^a
60	0.38 ± 0.02^b	6.83 ± 0.37^b
70	0.33 ± 0.02^c	4.22 ± 0.49^c

a b c : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p \leq 0.05$)

จากการทดลองวัดค่า A_w และผลการทดลองวัดค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นของน้ำยาขนมเจน อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบร่วมค่า A_w ของน้ำยาขนมเจนอบแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิมีค่าน้อยกว่า 0.6 และค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นไม่เกิน 13 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มาตรฐานชุมชนของผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมเจนได้กำหนดไว้(มพช. 2547) ผลของค่า A_w ที่มีผลต่ออาหารคือ ป้องกันและควบคุมจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย ทั้ง รา ยีสต์ และ แบคทีเรีย ค่า A_w ที่ต่ำๆ จะทำให้อาหารสามารถเก็บได้นานที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่น่าเสีย โดยไม่ต้องแข็งเย็น ผลของเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่มีต่ออาหาร คือ อาหารที่มีความชื้นหรือปริมาณน้ำสูงจะเป็นอาหารที่เสีย่าย เนื่องจากมีสภาวะเหมาะสม กับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสีย จากตารางที่ 4.1 จะเห็นได้ว่า อุณหภูมิในการอบน้ำยา ขนมเจนมีผลต่อค่า A_w และเปอร์เซ็นต์ความชื้น ยิ่งอุณหภูมิสูง ค่า A_w และเปอร์เซ็นต์ความชื้นจะมี ค่าที่ลดลง

4.2 ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพของน้ำยาขนมเจนหลังการอบแห้ง

4.2.1 ผลการศึกษาค่าสีของน้ำยาขนมเจนอบแห้ง

ผลของการศึกษาค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสี Colorflex Ez ทำการวัดน้ำยาขนมเจนอบแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิได้แก่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ทำการวัดน้ำยาขนมเจนอบแห้งที่ทำการละลายแล้ว เทียบกับน้ำยาขนมเจนที่ทำขึ้นใหม่ (Control) รายงานผลเป็นค่า L* a* b* ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาค่าสี

อุณหภูมิในการอบ (องศาเซลเซียส)		ผลการศึกษาค่าสีน้ำยาขnmjineแห้ง		
	L*	a*	b*	
50	57.59±1.45 ^{ab}	12.33±0.33 ^{ab}	31.68±1.07 ^a	
60	55.03±0.82 ^b	12.61±0.59 ^a	30.79±0.13 ^a	
70	58.52±1.95 ^a	11.57±0.16 ^b	31.49±1.15 ^a	

อุณหภูมิในการอบ (องศาเซลเซียส)		ผลการศึกษาค่าสีน้ำยาขnmjineแห้งที่ละลายน้ำ		
	L*	a*	b*	
control	54.94±0.63 ^a	9.77±0.36 ^b	26.64±0.82 ^b	
50	49.82±0.30 ^b	13.74±1.00 ^a	31.32±0.43 ^a	
60	49.33±0.25 ^b ^c	13.56±0.19 ^a	31.36±0.17 ^a	
70	48.82±0.08 ^c	13.15±1.76 ^a	31.42±0.28 ^a	

a b c : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

จากผลการทดลอง ค่าสีของน้ำยาขnmjine รายงานเป็นค่า L* a* b* ค่าสีของน้ำยาขnmjine แห้งที่วัดได้มีค่าใกล้เคียงกับค่าสีของน้ำยาขnmjine ที่มีส่วนผสมของกะทิ (จุฑามาศและเฉลิมพล, 2554) ที่มีค่า L* a* b* เท่ากับ 52.34 20.12 และ 40.85 ตามลำดับ ค่าที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน เนื่องจากส่วนผสมในการทำน้ำยาขnmjine ส่วนใหญ่ใช้วัตถุที่เหมือนกัน จะต่างกันที่ปริมาตรที่ใช้ กับ ส่วนผสมที่เป็นกะทิ จึงทำให้มีค่าสีที่ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าสีน้ำยาขnmjineแห้งที่ละลายน้ำจะเห็นได้ว่าค่า สีของมีค่าแตกต่างจากน้ำยาขnmjineที่ทำขึ้นใหม่ (Control) เนื่องจากอุณหภูมิในการอบน้ำยาขnmjine มีผลต่อค่าสีของน้ำยาขnmjine

4.2.2 ผลการศึกษาค่าการดูดซับน้ำของน้ำยาขnmjineอบแห้งที่ระยะเวลา 2 4 6 8 และ 10 นาที (ใช้น้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส)

ผลการหาค่าการดูดซับน้ำของน้ำยาขnmjine ที่ระยะเวลา 2 4 6 8 และ 10 นาที ของตัวอย่าง ทั้ง 3 อุณหภูมิ โดยที่ระยะเวลา 2 6 8 นาทีมีค่าการดูดซับน้ำไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ ระยะเวลา 4 และ 10 นาทีของแต่ละอุณหภูมิ มีค่าการดูดซับน้ำที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) ค่าการดูดซับน้ำที่ 50 องศาเซลเซียส มีค่าการดูดซับดีสุดที่ระยะเวลา 4 นาที แสดงให้เห็น ว่าน้ำยาขnmjine มีการคืนตัวที่ดีสุด คือ อุณหภูมิในการอบแห้ง 50 องศาเซลเซียส ละลายน้ำที่ ระยะเวลา 4 นาที ดังแสดงในตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ผลการศึกษาค่าการดูดซับน้ำของน้ำยาข้มจีนอุบแห้ง

อุณหภูมิการอบ (องศาเซลเซียส)	පෙරෝෂේන්තර්การดูดกลืนน้ำ/นาที				
	2	4	6	8	10
50	3.56±0.37B ^a	3.91±0.03A ^a	4.06±0.03A ^a	4.05±0.09A ^a	3.33±0.55C ^a
60	3.73±0.21B ^a	3.70±0.08B ^b	3.95±0.16AB ^a	4.05±0.10A ^a	2.71±1.37C ^b
70	3.52±0.09B ^a	3.64±0.06B ^b	3.84±0.13B ^a	3.96±0.12A ^a	3.20±0.44C ^a

abc : ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p \leq 0.05$)

ABC: ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนแสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p \leq 0.05$)

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.3 ค่าการดูดซับน้ำของน้ำยาข้มจีน 2 4 6 8 และ 10 นาที อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีค่าการดูดซับที่ดีที่สุดอยู่ที่ 4 นาที อุณหภูมิ 60 กับ 70 องศาเซลเซียสมีค่าการดูดซับน้ำดีที่สุดที่เวลา 8 นาที และผลที่ได้นี้เมื่อเทียบกับค่าการดูดซับน้ำของน้ำพريิกมะกอกป่า ผง น้ำพريิกมะกอกป่าผง มีการดูดซับน้ำที่ดีที่สุดอยู่ที่ 2 นาที การที่น้ำยาข้มจีนมีการดูดซับที่ช้ากว่าน้ำพريิกมะกอกป่าผง เป็นเพราะน้ำยาข้มจีนมีส่วนผสมที่มากกว่าและส่วนผสมรวมตัวดีกว่าน้ำพريิกมะกอกป่า ค่าการดูดกลืนจึงช้ากว่าน้ำพريิกมะกอกป่า เพราะมะกอกป่าเป็นไก่ไม่ค่อยเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆ จึงดูดกลืนได้ดีกว่า

จากผลการทดลอง อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส มีค่าการดูดซับน้ำได้ดีและใช้เวลาในการดูดซับน้ำใช้เวลาสั้นกว่าอุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีค่าการดูดซับน้ำอยู่ที่ 4 นาที จึงเหมาะสมที่สุดในการนำมาทดสอบทางด้านประสิทธิภาพ

4.3 ผลการศึกษาคุณภาพทางประสิทธิภาพแบบ 9-Points Hedonic scale

4.3.1 ผลการทดสอบทางประสิทธิภาพแบบ 9-Points Hedonic scale

ผลการทดสอบทางประสิทธิภาพของตัวอย่างน้ำยาข้มจีนที่ทำขึ้นใหม่ กับ ตัวอย่างน้ำยาข้มจีนที่อุบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสทำการล่ำลายน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เวลา 4 นาที โดยใช้ผู้ทดสอบชิมจำนวน 20 คน แสดงผลดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบทางประสิทธิภาพแบบ 9-Points Hedonic scale

ตัวอย่าง	ลักษณะประภูมิ ^{ns}	สี ^{ns}	กลิ่น ^{ns}	รสชาติ ^{ns}	ความชอบโดยรวม ^{ns}
control	6.75±1.16	6.50±1.19	7.00±1.37	6.95±1.53	7.25±1.02
อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส	6.95±0.99	6.90±1.12	6.10±1.74	6.80±1.83	6.80±1.36

ns : ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของตัวอย่างน้ำยاخنمจีนที่ทำขึ้นใหม่ กับตัวอย่างน้ำยاخنمจีนที่อุบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ผลจากการทดสอบทางประสาทสัมผัสปรากฏว่า น้ำยاخنمจีนอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส กับน้ำยاخنمจีนที่ทำขึ้นใหม่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ

4.3.2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ วิธีการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ (Paired comparison test)

ในการทดสอบทางประสาทสัมผัส จำนวนผู้ทดสอบ 20 คน ทำการทดสอบเกี่ยวกับน้ำยاخنمจีนกึ่งสำเร็จรูปว่ามีความเหมือน หรือต่างจากน้ำยاخنمจีนที่ทำขึ้นใหม่ (Control) ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ ของน้ำยاخنمจีนแห้งที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับน้ำยاخنمจีนที่ทำขึ้นใหม่ (Control) โดยเปรียบเทียบว่า น้ำยاخنمจีนที่ผ่านการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มี กลิ่น สี และรสชาติ เมื่อเทียบกับน้ำยاخنمจีนที่ทำขึ้นใหม่ จากผู้ทดสอบ 20 คน คนที่ให้คะแนนความเหมือนเท่ากับ 7 คน และคนที่ให้คะแนนต่างกัน 13 คน จากการแปรผลข้อมูล คำนวนหาค่าไคสแคร์ ซึ่งค่าไคสแคร์ที่คำนวนได้มีค่าน้อยกว่าค่าไคสแคร์จากการเปิดตาราง แสดงให้เห็นว่า น้ำยاخنمจีนที่อุบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีลักษณะน้ำแล้วมีความเหมือนกับน้ำยาที่ทำขึ้นใหม่



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำน้ำยาขนมจีนแห้ง โดยการใช้ตู้อบลมร้อนและเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนแห้ง กึ่งสำเร็จรูป

5.1.1 จากการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบน้ำยาขนมจีน ที่ใช้อุณหภูมิในการอบที่ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส ผลการทดลองปรากฏว่า อุณหภูมิที่ดีที่สุดในการอบคือ 50 องศาเซลเซียส เนื่องจากเป็นการทำน้ำยาขนมจีนที่ใช้อุณหภูมิต่ำหลังการทำแห้ง มีสีใกล้เคียงกับน้ำยาขนมจีนหลัง การปรงเสร็จใหม่ๆ แต่อุณหภูมิ 60 กับ 70 องศาเซลเซียส น้ำยาขนมจีนแห้งมากกว่า มีสีที่เข้มขึ้นมาก และมีกลิ่นคล้ายกับกลินปล่าย่าง

5.1.2 จากการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนแห้ง กึ่งสำเร็จรูป ที่ทำการอบแห้ง อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส น้ำยาขนมจีน ค่า A_w เท่ากับ 0.39 กับความชื้นของน้ำยาขนมจีน 8.62 เปอร์เซ็นต์ ค่าสีของน้ำยาขนมจีนแห้ง มีสีเหลืองแดง ในการละลายน้ำยาขนมจีนแห้ง ที่เหมาะสมที่สุด คือละลายน้ำร้อน ใช้เวลาในการละลาย 4 นาที จะได้น้ำยาขนมจีนที่ใกล้เคียงกับน้ำยาขนมจีนที่ทำขึ้นใหม่ การทดสอบทางประสาทสมัพส์ น้ำยาขนมจีนที่อบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีการทำการละลาย มีการยอมรับของผู้บริโภคไม่ต่างกันกับน้ำยาขนมจีนที่ทำขึ้นใหม่

5.2 ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบน้ำยาขนมจีนคือ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้น้ำยาขนมจีนมี A_w ความชื้น และค่าสีที่เหมาะสม ในการละลายน้ำยาขนมจีนละลายในน้ำร้อน ใช้เวลาในการละลาย 4 นาที น้ำยาขนมจีนอบแห้งที่ผ่านการคีนตัวแล้ว มีความเหมือนกับน้ำยาขนมจีนที่ทำขึ้นใหม่ และ สะอาดสนิท ผู้บริโภคสามารถรับประทานได้ทันที

บรรณานุกรม

- กรณีกา ชูเบค. 2550. ขนมจีนพ้อมน้ำยาสูตรต่างๆ. (สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2558) จาก Thairicenoodle.blogspot.com
- กัญญาณัฐ อุตรชน การตัดพิชชา ชื่อเมือง บุษบา มะโนแสน สุภาวดี ศรีແย়ມ และจิรรัชต์ กันทะญຸ. 2555. การศึกษาการแปรรูปน้ำพริกมะกอกป้าอองแห้ง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อ.ภูเพียง จ.เชียงใหม่.
- กุลชนากุล ประเสริฐสิทธิ์ จันทิมา ชั้งสิริพร ชุมนุช แสงวิเชียร ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ สุกฤทธิรา รัตนวีไล และไพบูลย์ อินนากิต. 2554. **ปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี 230-443 Chemical Engineering Laboratory II.** ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่.
- กรมอนามัย. 2550. **ปลา อาหารคู่ชีวิต.** สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวนันท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี.
- จุฑามาศ ถิรสาโรช และ เฉลิมพล ถนนวงศ์. 2554. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก.
- ชมพูนุช โสมालี สุแพรพันธ์ โลหะลักษณาเดช เกiergein วิทยา และสุพีญ ด้วงทอง. 2551. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการยึดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงบักช์ใต้. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
- นรินทร์ พันธุ์คุณ. 2552. การทำปลา rájaแบบพื้นบ้านอีสาน. (สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2559) จาก www.sanavicha.com
- ปารีรีย์ เรืองคล้าย จรวยพร นุ่มน้อย และกฤษณะ เรืองคล้าย. มปป. การศึกษาสภาพการทำงานของเปลือกที่เหมาะสมต่อคุณภาพเครื่องแกงส้มผงกึ่งสำเร็จรูป. มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง.
- ผกагร่อง ขวัญข้าว. 2557. กระเทียม-บัว สุดยอดสมุนไพรรักษาโรคหัวใจ. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันที่ 15 มีนาคม 2557. หน้า 9.
- พิมพ์จันทร์ กลุพันธ์ และมุทิตา นามทอง. 2556. ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการทำatalang กึ่งสำเร็จรูปโดยใช้วิธีการทำแห้งแบบตู้อบลมร้อน. สาขาวิชางานศิริและเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงษ์ เกียรติคุณ รัตนาปนนท์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. มปป. Capsaicin / แคพไซซิน. (สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2559) จาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3183/capsaicin
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงษ์ เกียรติคุณ รัตนาปนนท์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. มปป. การทำแห้ง (Dehydration). (สืบค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2559) จาก http://www.foodnetworksolution.com
- พีชเกษตรไทย. 2552. รวมสารต้านพีชเกษตร และเทคนิคต่างๆ. (สืบค้นเมื่อ 2 เมษายน 2559) จาก www.puechkaset.com

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2547. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ำยาขันมีนีนกึ่งสำเร็จรูป มพช. (498/2547).

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2556. ขنمจีน (อาหารไทย). (สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2558) จาก [https://th.wikipedia.org/wiki/ขنمจีน_\(อาหารไทย\)](https://th.wikipedia.org/wiki/ขنمจีน_(อาหารไทย))

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557. ตะไคร้. (สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2559) จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/ตะไคร้>

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2558. ข่า. (สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2558) จาก [https://th.wikipedia.org/wik/ข่า_\(พีช\)](https://th.wikipedia.org/wik/ข่า_(พีช))

สุกัญญา เดชอดิศัย. มปป. บทความสมุนไพรเรื่องของหอม . ภาควิชาเภสัชเวท และเภสัช พฤกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุราทิพ ภมรประวัติ. 2554. สมุนไพรนำรู้ กระชาย : ชะลอความแก่ และบำรุงกำลัง. หนอชาวบ้าน เล่มที่ 315. 15(9) : 6 -7.

Barbosa-Cánovas, G. V., & Vega-Mercado, H. (1996). **Dehydration of foods**. Springer Science & Business Media.



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY



ภาคผนวก ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การวิเคราะห์ทางเคมี

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

น้ำยาขنمจีนหลังการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส



50 องศาเซลเซียส

60 องศาเซลเซียส

70 องศาเซลเซียส

การวัดค่า A_w

การวัดค่า A_w โดยใช้เครื่องวัด A_w (A_w CX3TE AQUA LAB) มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการเปิดเครื่อง(A_w CX3TE AQUA LAB) จากนั้นทำการสอบเทียบเครื่องวัดค่า A_w เพื่ออ่านค่าค่า A_w ของน้ำกลั่น ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.99
2. นำตัวอย่างน้ำยาขنمจีนใส่ให้เต็มพื้นผิวของตลับทดสอบ นำเข้าเครื่องเพื่ออ่านค่า
3. ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องทำ 3 ช้า บันทึกค่าทุกครั้ง

การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น โดยวิธีของ A.O.A.C. (2000)

1. อุปกรณ์

- 1.1 ภาชนะอลูมิเนียมสำหรับหาความชื้น
- 1.2 ตู้อบไฟฟ้า
- 1.3 โกลด์ความชื้น
- 1.4 เครื่องซึ่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง

2. วิธีการหาความชื้น

การหาความชื้นแบบ AOAC (2000) เพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำยาขنمจีนที่อบแห้งทั้ง 3 อุณหภูมิ มีขั้นตอนในการหาความชื้นดังนี้

2.1 อบถ้วยอลูมิเนียมในตู้อบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนน้ำหนักคงที่ทำให้เย็นใน Desiccator นำมาซึ่งน้ำหนักที่แน่นอน

2.2 ซึ่งตัวอย่างน้ำยาขنمจีนที่อบแห้งประมาณ 3 กรัม ใส่ลงในถ้วยอลูมิเนียมที่อบแห้ง และบันทึกน้ำหนักที่แน่นอน

2.3 นำถ้วยอลูมิเนียมที่บรรจุตัวอย่างน้ำยาชนมจีนแห้งเข้าอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลาanan 2.5 ชั่วโมง นำออกมาใส่ใน Desiccator ทึ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง

2.4 นำมาซึ่งน้ำหนัก จะได้น้ำหนักตัวอย่างหลังจากอบแห้งแล้ว การคำนวนหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นจากสูตร

$$\text{เปอร์เซ็นต์ความชื้น} = \frac{\text{น้ำหนักที่หายไป (กรัม)}}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)}} \times 100$$



ภาควิชานวัตกรรม
การวิเคราะห์ทางภาษาพูด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

การวัดสี ด้วยเครื่อง ColorFlex EZ

1. การวัดค่าสีของน้ำยาข้นมีจีน

1.1 ทำการ Standardized เครื่องด้วยแผ่น Black glass และ With glass ก่อนการวัดตัวอย่าง การ Standardize เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น เพื่อ Set ค่าต่ำสุดและสูงสุด เพื่อการทำงานที่ถูกต้อง แม่นยำ (การ Calibrate) ทำการ Standardize ทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานเครื่อง (ที่หน้าจอจะแสดงข้อความ “To Assure Accuracy Please Standardize Instrument Now” ซึ่งเป็นการเตือนให้ทำการ Standardize เพื่อให้ค่าการวัดที่ถูกต้อง) ทำการ Standardize ทุกๆ 4 ชั่วโมง ในกรณีที่เปิดใช้งานเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำการ Standardize เมื่อมีข้อความ “To Assure Accuracy Please Standardize Instrument Now” แสดงที่หน้าจอ

1.2 นำน้ำยาข้นมีจีนแห้งที่บดละเอียดใส่ในถ้วย Glass sample cup ในปริมาณที่แสงจากเครื่องวัดสีไม่สามารถส่องทะลุได้ใช้ Sample Cup Cover ครอบ เพื่อป้องกันแสงภายนอก วาง Glass sample cup ที่มีตัวอย่างน้ำยาข้นมีจีนบน Sample cup port insert ที่ตัวเครื่องวัดสี วัดค่าสีของแต่ละตัวอย่างจำนวน 3 ชี้้า

1.3 นำน้ำยาข้นมีจีนที่บดละเอียดลายน้ำเดือดอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส รอให้ตัวอย่างน้ำยาข้นมีจีนเย็นก่อนการวัดสี นำตัวอย่างน้ำยาข้นมีจีนใส่ในถ้วย Glass Sample Cup ที่ใช้บรรจุตัวอย่างอาหารที่เป็นของเหลวแสงผ่านได้ ในการใช้งานต้องใช้ร่วมกับ Ring and disk set ใช้ Sample Cup Cover ครอบ เพื่อป้องกันแสงภายนอก วาง Glass sample cup ที่มีตัวอย่างน้ำยาข้นมีจีนบน Sample cup port insert ที่ตัวเครื่องวัดสี วัดค่าสีของแต่ละตัวอย่างจำนวน 3 ชี้้า

2. การรายงานค่าสี

ค่าสีจะรายงานเป็นค่า L^* a^* b^* โดยใช้หลักของสีที่ตรงข้ามกัน อ่านค่าตามแกน 3 แกน ได้เป็น 3 ค่าโดยแสดงค่าเป็น L^* a^* และ b^*

- L^* แสดงค่าความสว่าง มีค่าตั้งแต่ 0 (ดำ) จนถึง 100 (ขาว)
- a^* แสดงค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว

- ค่า a เป็นบวกจะแสดงค่าสีแดง
- ค่า a เป็นลบจะแสดงค่าสีเขียว
- b^* แสดงค่าความเป็นสีเหลืองและสีน้ำเงิน
- ค่า b เป็นบวกจะแสดงค่าสีเหลือง
- ค่า b เป็นลบจะแสดงค่าสีน้ำเงิน

การศึกษาการดูดซับน้ำของน้ำยาบนมีนีนแห้ง

มีวิธีการมีดังต่อไปนี้

1. นำมามีนีนอบแห้ง นำมาปั่นลดขนาดด้วยเครื่องปั่น
2. ซึ่งตัวอย่างน้ำยาบนมีนีนแห้ง 2 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ เติมน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ที่ทราบน้ำหนักแน่นอนประมาณ 10 กรัม แข็งทึบไว้เป็นเวลา 2 4 6 8 และ 10 นาที โดยจะแข็งไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิใช้อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
3. เมื่อครบเวลาจึงนำมารองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 93 ใช้เวลาในการกรอง 30 นาที
4. นำน้ำส่วนใส่ที่กรองได้ไปซึมน้ำหนัก
5. ทดลอง 3 ชั้้า คำนวณปริมาณน้ำที่น้ำยาบนมีนีนอบแห้งสามารถดูดซับไว้ได้ (กรัมต่อกรัม ตัวอย่าง) ดังสมการ

$$\text{ปริมาณน้ำที่ถูกดูดซับ} = \frac{\text{น้ำหนักน้ำเริ่มต้น (กรัม)} - \text{น้ำหนักน้ำที่กรองผ่านกระดาษกรอง(กรัม)}}{\text{น้ำหนักตัวอย่าง(กรัม)}}$$

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ภาควิชานวัตกรรม
ตัวอย่างแบบประเมินทางประสานสัมผัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

แบบประเมินผลการทดสอบทางด้านประสิทธิภาพ

แบบ 9-Points Hedonic scale

ชื่อผู้ทดสอบ..... วันที่..... เวลา.....

ชื่อผลิตภัณฑ์ น้ำยาขนมเจนกิงสำเร็จรูป

คำแนะนำ ทดสอบตัวอย่างแล้วให้คะแนนความชอบแต่ละคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ โดยให้คะแนนความชอบ 1-9 ตามคำอธิบายคะแนนความชอบด้านล่างนี้ แล้วกรุณาบันปักก่อนซิมตัวอย่างต่อไป
คะแนนความชอบ

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1=ไม่ชอบมากที่สุด | 6=ชอบเล็กน้อย |
| 2=ไม่ชอบมาก | 7=ปานกลาง |
| 3=ไม่ชอบปานกลาง | 8=ชอบมาก |
| 4=ไม่ชอบเล็กน้อย | 9=ชอบมากที่สุด |
| 5=เฉยๆ | |

คุณลักษณะ	รหัส 434	รหัส 102
ลักษณะปราศจาก		
สี		
กลิ่น		
รสชาติ		
ความชอบโดยรวม		

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

แบบ วิธีการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ (Paired comparison test)
ผลิตภัณฑ์น้ำยาขนมเจนกิงสำเร็จรูป

ชื่อ..... วันที่..... ชุดที่.....

คำแนะนำ : กรุณาซึมตัวอย่าง 2 ตัวอย่างนี้ตามลำดับที่นำเสนอด้วยชัยไปขวา และเขียนเครื่องหมาย ✓ ตามความรู้สึกของท่าน และกรุณาระบุว่าตัวอย่างทุกครั้ง

ตัวอย่าง 434 กับ 102



เหมือน



ต่าง

ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

การคำนวณผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบวิธีการเปรียบเทียบตัวอย่างคู่ (Paired comparison test)

$$\text{สมมติฐาน } H_0 : O_i = E_i$$

$$H_1 : O_i \neq E_i$$

ค่า $\alpha = 0.05$

ค่าคาดหวัง เท่ากับ $\frac{\Sigma O}{2} = 10$

สูตรที่ใช้

$$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \quad \text{เมื่อ } df = k-1, \quad 2-1=1$$

ตาราง ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ การเปรียบเทียบตัวอย่างคู่

ความถี่	O	E	(O-E)	$(O-E)^2$	$\frac{(O-E)^2}{E}$
เหมือน	7	10	-3	9	0.9
ไม่เหมือน	13	10	3	9	0.9
รวม	20			$X^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = 1.8$	

นำค่า α ที่ 0.05 และค่า $df=1$ เปิดตารางคีสแคร์ ได้ค่า $X^2 = 3.84$ ดังนั้นค่า X^2 ที่คำนวณได้มีค่า น้อยกว่า X^2 จากการเปิดตาราง จึงยอมรับ H_0 หมายถึง น้ำยาขันมีนิ่นที่อบแห้งมีความเหมือนกันกับ น้ำยาขันมีนิ่นที่ทำขึ้นใหม่

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ประวัติคณะผู้วิจัย

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวภัสรา บุราณเดช

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Phasara Burandat

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 1440500131605

อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอทางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120

หมายเลขโทรศัพท์ : 080-7558178

e-mail : mind_1005@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษาโรงเรียนโนนสูงวิทยา ปี พ.ศ. 2548

- มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม ปี 2551

- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม ปี 2554

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวยุพิน เสนาใหญ่

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Yupin Senayai

เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 1440900184731

อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก : บ้านเลขที่ 69 หมู่ 14 ต.บ้านหวาย อ.วาปีปุ่ม จ. มหาสารคาม 44120

หมายเลขโทรศัพท์ : 092-5788168

e-mail : airyupin_1993@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแต้ 2548

- มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนาข่าวิทยาคม 2551

- มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนาข่าวิทยาคม 2554

หัวข้อวิจัย	การทำแห้งน้ำยาขnmjineกึ่งสำเร็จรูป
ผู้ดำเนินการวิจัย	ภัสรา บุราณเดช และยุพิน เสนาใหญ่
ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทธิป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน	สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปี พ.ศ.	2559

บทคัดย่อ

การศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบแห้งน้ำยาขnmjine โดยใช้อุณหภูมิในการอบแห้ง 3 อุณหภูมิ คือ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบร้า น้ำยาขnmjineแห้งที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมีลักษณะที่เหมาะสมที่สุด เมื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพทางด้าน เคมี การภาพ และ ประสิทธิภาพ พบว่า น้ำยาขnmjineที่อบแห้ง 50 องศาเซลเซียส มีค่า Aw เท่ากับ 0.39 มีความชื้น 8.62 เปอร์เซ็นต์ มีค่าสี L* a* b* เท่ากับ 57.59 12.33 และ 31.68 ตามลำดับซึ่งค่าสีมีความเป็นสี เหลืองแดง เมื่อทำการละลายน้ำยาขnmjineในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส น้ำยาขnmjineแห้ง ละลายได้ดีที่เวลา 4 นาที เมื่อการทดสอบการยอมรับทางด้านประสิทธิภาพของน้ำยาขnmjineที่ผ่าน การอบแห้งมาละลายน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เทียบกับน้ำยาขnmjineที่ปรุงชื้นใหม่ พบร้า คะแนนความชอบไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ($p>0.05$)

คำสำคัญ : น้ำยาขnmjine การทำแห้ง การทำแห้งแบบถาวร อุณหภูมิในการอบแห้ง การละลาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

Research Title	Drying of Thai noodles sauce
Researcher	Phasara Burandet and Yupin Senayai
Research Consultants	Assistant Professor Dr. Choothawee Palagawong Na Ayudhya
Organization	Food Technology Faculty of Agricultural Technology Bachelor of Science Rajabhat Maha Sarakham University
Year	2016

ABSTRACT

The optimum temperatures (50, 60 and 70 °C) for drying Thai noodles sauce were investigated. The result was found that drying at 50 °C was optimal temperature with Aw of 0.39, moisture content of 8.62 and L * a * b * values of 57.59, 12.33 and 31.68, respectively. The dried Thai noodles sauce showed the colors of yellow-red. Dried Thai noodles sauce was dissolved in hot water (80 °C) within 4 minutes. No differences of sensory attribute were found when compared to the new cooked Thai noodles sauce ($p > 0.05$).

Keywords: Thai noodles sauce, Dehydration, Tray drying, Drying temperature, Solubility

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูทธิป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการนวัตกรรมที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยในครั้งนี้

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในด้านสถานที่เครื่องมือและให้ความอนุเคราะห์ในการใช้อุปกรณ์ในการทำวิจัย และคำแนะนำในการทำวิจัยในครั้งนี้

ท้ายด้วยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนในการทำวิจัยในครั้งนี้ จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภัสรา บุราณเดช

ยุพิน เสนาใหญ่

2559



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
ขอบเขตของโครงการวิจัย	2
นิยามศัพท์	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
น้ำยาขนมจีน	3
ส่วนผสมในน้ำยาป่า	3
การทำแห้ง Dehydration	5
การอบแห้งแบบถาด Tray Drying	5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการอบแห้ง	6
การคืนรูปของอาหารแห้ง	8
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	8
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	10
วัตถุติบและอุปกรณ์	10
วิธีดำเนินการทดลองทำน้ำยาขนมจีนแห้ง	11
บทที่ 4 ผลการวิจัย	15
ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีของน้ำยาขนมจีนหลังการอบแห้ง	15
ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านกายภาพของน้ำยาขนมจีนหลังการอบแห้ง	15
ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส	17

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	19
สรุปผลการวิจัย	19
ข้อเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์	19
บรรณานุกรม	20
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก การวิเคราะห์ทางเคมี	22
ภาคผนวก ข การวิเคราะห์ทางกายภาพ	25
ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบประเมินทางประสาทสัมผัส	28
ประวัติผู้วิจัย	32



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	ส่วนผสมของน้ำยาขันมีจีน (น้ำยาป่า)	11
4.1	ผลการศึกษาคุณภาพทางด้านเคมีน้ำยาขันมีจีนหลังการอบแห้ง	15
4.2	ผลการศึกษาค่าสี	16
4.3	ผลการศึกษาค่าการดูดซับน้ำของน้ำยาขันมีจีนอบแห้ง	17
4.4	ผลการทดสอบทางประสิทธิภาพสัมผัสแบบ 9-Points Hedonic scale	17
ค-1	ผลการทดสอบทางประสิทธิภาพสัมผัสแบบ การเปรียบเทียบตัวอย่างคู่	31



สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1.1	น้ำยาป่า	1
2.1	ส่วนประกอบเครื่องอบแห้ง	6
2.2	อัตราการทำแห้ง	7
3.1	ขั้นตอนการอบน้ำยาชนมเงิน	11
ก-1	น้ำยาชนมเงินหลังการอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส	23



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY